

Expectativas (pronóstico)

La recurrencia de la fiebre reumática es probable en las personas que no toman dosis bajas de antibióticos en forma continua, especialmente durante los primeros 3 a 5 años después del primer episodio de la enfermedad. Las complicaciones cardíacas pueden ser graves, particularmente si hay compromiso de las válvulas del corazón.

Complicaciones

- Daño a las válvulas cardíacas (especialmente y aórtica).
- Corea de Sydenham.

Dado que algunas otras afecciones tienen síntomas similares, se necesitará una evaluación médica cuidadosa si se presentan síntomas de fiebre reumática. Si tiene síntomas de faringitis estreptocócica, coméntele al médico. Si usted padece en verdad esta enfermedad, necesitará evaluación y tratamiento con el fin de disminuir el riesgo de desarrollar fiebre reumática.

Tratamiento

Reposo en cama de 6-8 semanas, que por lo general es el tiempo que dura el brote reumático. Vía cada 24 horas por unos 10 días. En pacientes alérgicos a la penicilina se suele recomendar usar a razón de 500 mg/día o bien en dosis de 500 mg/día en caso de a las sulfas.

Para el manejo de la fiebre, dolor y los síntomas articulares se recomiendan los . Los se indican para los casos más graves.

Si existe la enfermedad de Corea, sedación.



Administradora de Riesgos de Salud
ARS-UASD
Fundada el 19 de Julio de 2007
RNC-4-30-05927-7

Tu Salud Garantizada

Santo Domingo
c/ Juan Sánchez Ramírez No. 32 Gazcue
Correo: infoarsuasd@gmail.com
Teléfono: (809) 221 4949


Santiago de los Caballeros
Av. Salvador Estrella Sadhalá No. 1
Plaza Olímpica 2do nivel Local 204
Correo: ArsuasdSantiago@gmail.com
Teléfono: (809) 724 9027

San Juan de la Maguana
c/ Wenceslao Álvarez No. 115 (Antiguo Centro UASD)
Correo: arsuadsanjuandelamaguana@gmail.com
Teléfono: (809) 557-2945



Administradora de Riesgos de Salud
ARS-UASD
Fundada el 19 de Julio de 2007
RNC-4-30-05927-7

Programa de Promoción y Prevención Fiebre Reumática



PyP /ARS UASD

ARS- UASD

TU Salud Garantizada

La ARS-UASD, es la administradora de riesgo de salud los servidores universitarios y sus familiares constituida de acuerdo a la ley 87-01 y sus normas complementarias. Contamos con una vasta experiencia de trabajo, enfocados en ofertar óptimo servicios de salud a nuestros afiliados, Con la más elevada calidad, calidez y humanización.

Afiliación

Los servidores activos o jubilados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que por ley son incorporados a la ARS-UASD, se denominan Afiliados Titulares, mientras que, los Dependientes con derecho a Servicios de Salud, serán todos los que Dependen Directamente del Afiliado, como: Esposa (o) o compañero (a) de vida, debidamente registrado (a) Hijos menores, hasta los 18 años ó hasta los 21 si están estudiando. De por vida, si los hijos son "Discapacitados" (con trastornos que le impidan físicamente depender de ellos mismos). Los Padres, si viven con los afiliados y dependen directamente de estos.

Requerimientos de afiliación

Titular	Copia De Cedula
Espos(a)	Acta de Matrimonio, Copia de Cedula
Hijos	Acta de Nacimiento
Hijos Mayores de 21 años	Acta de Nac., Cedula, Certificado de estudio.
Padres	Acta de Nac. Del Titular, Copia de Cedula
Tod@s	1 Foto 2X2

Fiebre Reumática

Enfermedad inflamatoria sistémica del tejido conectivo, aguda o sub-aguda, que aparece como una secuela retardada de una infección faríngea por estreptococos del grupo A en personas con predisposición genética a la enfermedad.

Compromete principalmente el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro.

Factore de Riesgo

La fiebre reumática afecta principalmente a los niños entre los 6 y 15 años de edad y ocurre aproximadamente 20 días después de una faringitis estreptocócica o de escarlatina.

Síntomas

Dolor abdominal. . Problemas del corazón (cardíacos) que pueden ser asintomáticos o pueden ocasionar dificultad respiratoria y dolor torácico. Dolor articular, (principalmente en las rodillas, los codos, los tobillos y las muñecas) Inflamación articular, enrojecimiento o calor. Hemorragias nasales . Nódulos cutáneos. Erupción en la piel (eritema marginado):

1.- erupción cutánea en el tronco y en la parte superior de brazos o piernas.

2.- erupciones que pueden tener apariencia de anillo o parecido a una serpiente.

De Sydenham (inestabilidad emocional, debilidad muscular y movimientos convulsivos espasmódicos descoordinados y rápidos que afectan principalmente la cara, pies y las manos)

Signos y Exámenes

Para ayudar a estandarizar el diagnóstico de la fiebre reumática, se han desarrollado algunos criterios principales y secundarios. El hecho de encajar dentro de dichos criterios, al igual que tener evidencia de una infección reciente por estreptococos pueden ayudar a confirmar que uno tiene fiebre reumática.

Los exámenes pueden abarcar:

- Antiestreptolisina O (ASO).
- Hemograma completo.
- Eritrosedimentación.
- Electrocardiografía.

Algunos de los criterios principales son:

- Artritis en algunas articulaciones (poliartritis)
- Inflamación del corazón
- Nódulos debajo la piel (nódulos)
- Movimientos rápidos y espasmódicos (corea,)
- Erupción cutánea (eritema marginado)

Entre los criterios secundarios están:

- Fiebre
- Tasa elevada de sedimentación de eritrocitos.
- Artralgia.
- Otros hallazgos de laboratorio.

El diagnóstico de fiebre reumática se da si uno satisface dos criterios principales, o uno principal y dos secundarios, al igual que si muestra signos de que ha tenido una infección previa por estreptococos.